

آشنایی با فرق (هرنی)



ویره: بیماران

کد پمفت: PAE-PM-01-18

تاریخ آخرین بازنگری: 1403/3/1

تایید کننده: واحد آموزش به بیمار

تایید کننده: آقای دکتر میرحسینی

متخصص جراحی عمومی

* معمولاً دردهای ناحیه کشاله ران پس از عمل جراحی، مربوط به تحت کشش بودن عضلات و تاندون های آن ناحیه است که به مرور زمان برطرف می شود. می توانید جهت بهبود درد، از کمپرس آب گرم همراه با قرص مسکن استفاده نمایید.

در صورت بروز چه علائمی باید به پزشک مراجعه کنید؟



منابع:

- <https://www.clinicalkey.com>

شماره مرکز تلفن بیمارستان: ۰۹-۵۵۶۲۶۴۷۷

شماره تلفن اورژانس بیمارستان: ۰۹-۳۲۴۵۲۵۷

شماره تلفن بخش داخلی: ۰۹-۳۲۵۳۲۱۸

شماره تلفن نوبت دهی درمانگاه:

۰۹-۳۵۶۸۶۰۴۵-۰۶۸۶۷۷

سایت بیمارستان: <https://tomc.sbm.ac.ir>

آدرس: تهران - خ بهارستان - روبروی سازمان تبلیغات

اسلامی - مرکز پزشکی آموزشی درمانی طرفه

توصیه های زمان ترخیص از بیمارستان:

* هنگام ترخیص و خروج از بخش، حتماً خلاصه پرونده، نسخه داروهای تجویز شده و فرم آموزش ترخیص را دریافت کنید.

* در صورتی که نمونه برداری حین عمل داشته اید در خلاصه پرونده شما قید می شود.

* جواب آزمایش آسیب شناسی (باتولوژی) شما حدود ۰-۱ روز بعد از عمل جراحی آماده می شود لطفاً پیگیر جواب آزمایش خود از بخش باشید.

* ویزیت بعدی خود را فراموش نکنید.

* داروهای تجویز شده را به صورت منظم و کامل مصرف کنید.

* ۷ الی ۱۰ روز بعد از عمل، جهت کشیدن بخیه ها به پزشک معالج مراجعه نمایید.

* فعالیت های خود را از سر برگیرید، زیاد راه بروید اما از فعالیت سنگین و بلند کردن اجسام سنگین پرهیزید.




* در موقع سرفه و عطسه، با گذاشتن دست در محل عمل می توانید از ایجاد درد یا آسیب در ناحیه عمل پیشگیری کنید.



مددجوی گرامی:


با آرزوی سلامتی برای شما

این مطالب به منظور آشنایی با فتق (هرنی) و مراقبت‌های لازم در مورد آن تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.



۴ فتق (هرنی) چه علائمی را ایجاد می‌کند؟

- * احساس ناراحتی یا درد در ناحیه کشاله ران که با بلند کردن جسم و یا خم شدن به جلو این ناراحتی تشدید می‌شود.
- * وجود توده برجسته در کشاله ران که با لمس دردناک می‌شود.



فتق عبارت است از بیرون زدن یکی از اعضاء داخلی بدن از راه یک نقطه ضعیف یا یک سوراخ در عضلات اطراف آن.

فتق هنگامی رخ می‌دهد که لایه‌های عضلانی ضعیف شده باشند.

ورود احتشای شکم به داخل محل فتق، می‌تواند باعث گیر افتادگی قسمتی از روده یا سایر اعضاء داخل شکم در داخل این بیرون‌زدگی شود که بسیار خطرناک است و نیاز به عمل اورژانسی دارد.

۲ فتق (هرنی) چگونه تشخیص داده می‌شود؟

معمولًاً معاینات فیزیکی برای تشخیص فتق کشاله ران کافی است.

پزشک بیرون‌زدگی ناحیه کشاله ران را بررسی می‌کند. از آنجا که ایستادن و سرفه کردن باعث برجسته شدن فتق می‌شود از شما خواسته می‌شود تا بایستید یا سرفه کنید. اگر پزشک توانست به راحتی فتق را تشخیص دهد، از روش‌های تصویربرداری مانند سونوگرافی شکم و سی‌تی اسکن کمک می‌گیرد.

۳ فتق (هرنی) چگونه درمان می‌شود؟

در صورتی که فتق کوچک باشد و باعث آزار شما نشود، پزشک آگاهانه صبر می‌کند. در صورت عدم نیاز به جراحی به شما توصیه می‌شود از اعمال فشار به شکم خودداری کرده و از فتق بند استفاده نمایید.

اما اگر فتق بزرگ شده یا دردناک باشد معمولاً به عمل جراحی فتق نیاز دارد تا ناراحتی بطرف شده و از عوارض بعدی آن پیشگیری شود.

دو نوع عمل جراحی برای فتق وجود دارد.

* عمل جراحی باز

* عمل جراحی بسته (laparoscopic)

در صورت نیاز به جراحی، طبق صلاحیت پزشک نوع جراحی برای شما مشخص می‌شود که شما باید در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار بگیرید.

